

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115006HSLF

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

HSLF-FS 2015:6

Utkom från trycket
den 22 juli 2015

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn;

beslutade den 1 juli 2015.

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 12 § smittskyddsförordningen (2004:255).

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid vaccination av barn inom barn- och skolhälsovården.

Vaccinationsprogram

2 § Barn- och skolhälsovården ska till alla vårdnadshavare erbjuda vaccination av de barn som är födda år 2002 eller senare, i enlighet med följande program.

Ålder	Barnhälsovård					Elevhälsa		
	3 mån	5 mån	12 mån	18 mån	5–6 år	6–8 år	10–12 år	14–16 år
Årskurs						1–2	5–6	8–9
Difteri	I	II	III		IV			V
Stelkramp								
Kikhosta								
Polio								
Hib*								
Pneumokocker								
Mässling				I		II		
Påssjuka								
Röda hund								
HPV**							I+II	

* Haemophilus influenzae typ b

** Humant papillomvirus

Kommentar: Övriga vaccinationsprogram, se 6 §.

Vaccin mot HPV ska ges i två doser. Dos II ska ges efter att minst 6 månader har gått efter att dos I gavs.

3 § Vid vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta ska dos I–IV ges som fulldosvaccin och dos V ges med reducerad antigenhalt.

Vid vaccination mot pneumokocker ska ett konjugatvaccin användas.

4 § Utgångspunkten för beräkningen av tidpunkten för vaccination ska vara ett barns kronologiska ålder, även om barnet är för tidigt fött.

5 § Inom ramen för ovanstående program får tidpunkten för vaccination förskjutas enligt följande:

1. Dos I–III för vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib (Haemophilus influenzae typ b) och pneumokocker får ges två veckor före den i programmet rekommenderade åldern, dock med minst sex veckors intervall mellan dos I och II och sex månaders intervall mellan dos II och III.
2. Dos I för vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker får ges upp till sex månaders ålder. Dos II får ges upp till sex månader efter dos I. Dos III får ges upp till två års ålder, dock med ett intervall av sex månader mellan dos II och III.
3. Dos I för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund får ges från tolv månaders ålder.
4. Intervallet mellan dos I och II för vaccination mot HPV får vara högst tolv månader.

Övriga vaccinationsprogram

6 § För vaccination mot tuberkulos, hepatit B, pneumokocker, influensa och HPV har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen givit ut följande allmänna råd och rekommendationer:

1. Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) Vaccination mot influensa
2. Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) Vaccination mot pneumokocker
3. Socialstyrelsens rekommendationer för profylax mot hepatit B, Profylax med vaccin och immunoglobulin - före och efter exposition
4. Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos
5. Socialstyrelsens rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus (HPV).

Kompletterande vaccinationer

7 § Barn som är födda före år 2002 ska erbjudas vaccination i enlighet med bilagorna 1 och 2. För vaccination mot HPV ska dock gälla vad som sägs i 2 § första stycket.

Övrigt

**HSLF-FS
2015:6**

8 § Barn upp till 18 års ålder som inte har vaccinerats i enlighet med vaccinationsprogrammet i 2 § ska erbjudas kompletterande vaccination. Kompletterande vaccination mot pneumokocker och HPV behöver dock inte erbjudas.

9 § Avsteg från vaccinationsprogrammet i 2 §, utöver de som anges i dessa föreskrifter, får göras genom ordination av den ansvarige läkaren inom barnhälsovården och elevhälsan.

Undantagsbestämmelse

10 § Folkhälsomyndigheten kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Folkhälsomyndigheten

JOHAN CARLSON

Ann Lindstrand
(Avdelning för epidemiologi
och utvärdering)

Schema för vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio

Årskohorter	Schema	Barnhälsovården	Elevhälsan årskurs 4	Elevhälsan årskurs 8 eller 9
Barn födda		5–6 års ålder	9–11 års ålder	14–16 års ålder
1995	3+5+12 mån. +5–6 år +10 år	IPV år 2000–01	DTP åk 4 läsår 2005–06	
1996	3+5+12 mån. +5–6 år +10 år	IPV år 2001–02	DTP åk 4 läsår 2006–07	
1997	3+5+12 mån. +5–6 år +10 år	IPV år 2002–03	DTP åk 4 läsår 2007–08	
1998	3+5+12 mån. +5–6 år +10 år	IPV år 2003–04	DTP åk 4 läsår 2008–09	
1999	3+5+12 mån. +5–6 år +10 år	IPV år 2004–05	DTP åk 4 läsår 2009–10	
2000	3+5+12 mån. +5–6 år +10 år	IPV år 2005–06	DTP åk 4 läsår 2010–11	
2001	3+5+12 mån. +5–6 år +10 år	IPV år 2006–07	DTP åk 4 läsår 2011–12	
2002	3+5+12 mån. +5–6 år +14–16 år	DTP-IPV år 2007–08		DTP åk 8 läsår 2016–17 eller åk 9 läsår 2017–18
2003	3+5+12 mån. +5–6 år +14–16 år	DTP-IPV år 2008–09		DTP åk 8 läsår 2017–18 eller åk 9 läsår 2018–19

Schema för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Årskohorter	Schema	Barnhälsovården	Elevehälsan årskurs 1–2	Elevehälsan årskurs 6
Barn födda		18 mån. ålder	6–8 års ålder	12 års ålder
1995	18 mån. +12 år	MPR år 1996–97		MPR åk 6 läsår 2007–08
1996	18 mån. +12 år	MPR år 1997–98		MPR åk 6 läsår 2008–09
1997	18 mån. +12 år	MPR år 1998–99		MPR åk 6 läsår 2009–10
1998	18 mån. +12 år	MPR år 1999–00		MPR åk 6 läsår 2010–11
1999	18 mån. +12 år	MPR år 2000–01		MPR åk 6 läsår 2011–12
2000	18 mån. +12 år	MPR år 2001–02		MPR åk 6 läsår 2012–13
2001	18 mån. +12 år	MPR år 2002–03		MPR åk 6 läsår 2013–14
2002	18 mån. +6–8 år	MPR år 2003–04	MPR åk 1 läsår 2009–10 eller åk 2 läsår 2010–11	
2003	18 mån. +6–8 år	MPR år 2004–05	MPR åk 1 läsår 2010–11 eller åk 2 läsår 2011–12	

HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten.

Webb: www.folkhalsomyndigheten.se

Författningen kan beställas via:

Fritzes

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: order.fritzes@nj.se

Webb: fritzes.se