

När smittan kommer – en vägledning för dig som är arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet

Covid-19 är en samhällsfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Det betyder att den läkare som får kännedom om att en person är smittad skyndsamt ska anmäla det till regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten och påbörja en smittspårning. Det innebär även att en person som vet eller har anledning att misstänka att hen är smittad är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Den är även skyldig att lämna information om smittan till de personer som kan vara exponerade för smitta.

Syfte

Vägledningen är till för dig som är arbetsgivare, privat företagare eller ansvarig för en verksamhet eller en skola/förskola. Vägledningen är tänkt att fungera som ett stöd vid bekräftade fall på arbetsplatsen eller i verksamheten och kan även användas vid förberedelser för ett eventuellt utbrott på arbetsplatsen/i verksamheten. Vägledningen beskriver också smittskyddsläkarens ansvar, smittspårningsenhetens roll och hur en smittspårning går till.

Ändringshistorik

Datum	Ändring	Utförd av
2021-05-18	Förtydligande avseende kartläggning och smittspårning i verksamheten. Uppdaterad definition av nära kontakt. Uppdaterad info om testning av barn och unga. Förtydligat undantag från smittspårning. Nytt avsnitt om munskydd vid konstaterad smitta. Avsnittet om antigenestning uppdaterat.	LLS
2021-03-24	Större uppdatering. Nytt avsnitt om nära kontakter (alla nära kontakter rekommenderas provtagning) och om antigenester. Uppdaterat avsnitten om hushållskontakter och om smittspårningsenheten.	LLS
2020-11-06	Större omarbetning. Tillägg av stycke om hushållskontakter och hemisolering.	LLS, TD, EA

Kartläggning och smittspårning i verksamheten

Vid ett bekräftat fall påbörjas en smittspårning och den smittade har ett ansvar att informera verksamheten om vederbörande har varit där i smittsamt skede och därmed kan ha utsatt andra personer i verksamheten för smitta. Det är inte säkert att de blivit smittade eller kommer att bli sjuka, men de behöver informeras. Den som är arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet behöver många gånger hjälpa till att kartlägga vilka som är nära kontakter och därmed utsatta för smitta samt hjälpa till att informera dessa individer.

Om den smittade personen ber dig om hjälp med att informera nära kontakter är detta dokument ett stöd till dig. Främst gäller det om de har varit i nära kontakt med personen som har covid-19. Hen har oftast fått information om hur nära kontakter identifieras och har fått en länk till ett informationsblad att dela ut till dessa. Av erfarenhet vet vi att det finns ett stort behov av information även till de som inte är direkt utsatta för smittrisk.

Vad är min roll vid ett eller flera bekräftade fall i min verksamhet?

Du har en nyckelfunktion för att kunna informera andra som varit utsatta för risk om detta. Vi vill därför be dig att informera dem som vistats i den angivna verksamheten vid den aktuella tidpunkten om att de kan ha utsatts för en smittrisk. De som identifieras som nära kontakter ska få en länk till informationen [Till dig som kan ha blivit utsatt för smitta av covid-19 - 1177 Vårdguiden](#). Övriga personer som vistats i verksamheten behöver också informeras, till dem skickas *"Information och instruktioner till dig som varit i en verksamhet där det konstaterats fall av covid-19"*.

Särskilt informationsmaterial har tagits fram till skolor och förskolor, [se Samarbetsportalen](#). Se även riktad information till förskola och skola på [Folkhälsomyndighetens hemsida](#).

Ditt ansvar som arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet

Som verksamhetsansvarig har du ansvar för kommunikation gentemot allmänhet och medier. Det är också huvudmannen/verksamhetsansvarig som fattar beslut om tex stängning av verksamhet eller övergång till digitalt arbete/undervisning. Efter samråd med smittskyddsläkaren kan verksamhetsansvarig stänga en verksamhet för att motverka smittspridning vid ett pågående utbrott. Smittskyddsläkaren fungerar endast som rådgivande och har inget mandat att själv fatta beslut om stängning. När en verksamhet stängs för att bryta smittkedjor finns det ofta en pågående smittspridning i samhället. Påminn därför om vikten av allas ansvar att minska smittspridningen och att följa de föreskrifter och råd som finns.

Sekretess

Du ska aldrig informera andra om vem som har covid-19 om du inte har fått personens tillåtelse. Ge aldrig mer information kring den smittade än nödvändigt, oavsett om personen gett sitt samtycke eller inte.

Smittskyddsläkarens ansvar

Smittskyddsläkaren har det övergripande ansvaret för smittsamma sjukdomar i regionen.

Smittspårningsenheten Kalmar

Nationell prioriteringsordning för smittspårning:

1. Hälso- och sjukvård samt omsorg (omsorg i detta sammanhang innefattar äldreomsorg och funktionshinderomsorg, men inte barnomsorg)
2. Riskländer för import av SARS-CoV-2 (nya mer allvarliga varianter eller andra nya förändringar i epidemiologin)
3. Hushållet
4. Andra riskmiljöer för allmänheten, till exempel arbetsplatser och sammankomster

Smittspårningsenheten i Kalmar län utgår från prioriteringsordningen ovan, dvs fokuserar på kategori 1 och 2 samt hushållskontakter till dem som fått ett positivt självtest. Kategori 4, misstänkta utbrott i andra riskmiljöer för allmänheten, handläggs av smittskyddet och/eller smittspårningsenheten i mån av resurser. Utbrott på skolor och förskolor handläggs i första hand av smittskyddet. Smittspårningsenheten hjälper till med att identifiera hushållskontakter och utfärda läkarintyg för smittbärappenning. Vid hård belastning kan inte garanteras att smittspårningsenheten kan kontakta samma dag.

Så kan du förbereda dig och din verksamhet

När en person med koppling till verksamheten konstateras smittad av covid-19 behövs det snabbt, ibland inom loppet av några timmar, vidtas åtgärder för att stoppa spridningen och identifiera vilka personer som kan vara smittade. Varje verksamhet bör ha en plan för hur ni ska agera vid ett eller flera bekräftade fall i verksamheten.

Checklista för lämpliga förberedelser och aktiviteter:

- Säkerställ att det finns uppdaterade och lättillgängliga **listor över kontaktuppgifter till personal/kunder/deltagare/vårdnadshavare**. Tänk även på att inkludera vikarier, studenter, praktikanter och lärlingar. Även övriga personer som kan ha kontakt med gruppen behöver identifieras, exempelvis städpersonal, transportörer eller liknande. Har verksamheten sammankomster eller utbildningar är det bra att göra en förteckning över vilka som har deltagit. De personer som den smittade haft kontakt med behöver identifieras snabbt. Detta sker ofta via smittspårningen i kontakten med den smittade.
- Om personer utan svenskt personnummer finns i verksamheten, säkerställ att det finns en rutin gällande provtagning av dessa. Provtagningen sker på hälsocentral och om det rör många individer bör kontakt tas med aktuell hälsocentral för planering.
- Om smitta skulle konstateras i personalgruppen leder detta ofta till stor oro och rädsla. Säkerställ att det finns en **beredskap för att hantera de frågor som uppkommer**. På [Arbetsmiljöverkets hemsida](#) finns mer råd kring detta.
- Vid ett utbrott på en arbetsplats eller inom en verksamhet kan det bli ett hårt tryck från media och allmänheten att få veta vad som händer. Här behövs en noggrann avvägning vad som kan anses vara allmänintresse och vad som faller under patientsekretessen/den personliga integriteten. Öppenhet mot medierna lönar sig oftast för att undvika ryktesspridning. Utse vem som ska vara **talesperson mot media**. Vid behov utse även någon som besvarar frågor i era sociala medier. Ofta behövs det fler

resurser än i normala fall för att säkerställa att personerna kan få avlösning vid långvarig belastning.

- Sammankalla ledningsgrupp och informera/involvera skyddsombud i hanteringen.
- Fundera på vem som behöver informeras och på vilket sätt. Utse talesperson/er enligt ovan. Överväg om pressmeddelande behövs.
- Se till att verksamhetens huvudkontor eller motsvarande hålls informerade och att de är införstådda med vilka som är talespersoner gentemot de egna anställda och medier.
- Om smitta förekommer inom en kommunal verksamhet eller på ett större företag/en större arbetsplats i kommunen ska kommunens Tjänsteman i beredskap (TiB) informeras.

Här är de **informationspunkter du behöver förmedla till de anställda/deltagare i verksamheten:**

- Ett eller flera bekräftat fall med koppling till verksamheten har konstaterats
- Smittspårning pågår och de personer som har utsatts för smitta kommer att kontaktas separat
- Vikten av att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd (håll avstånd, handhygien, stanna hemma om du är sjuk)
- Uppmuntra till hemarbete om det är möjligt
- Skärpt uppmärksamhet på symtom, även lindriga
- Stanna hemma vid symtom och beställ provtagning på 1177.se. Var förberedd genom att se till att du har en giltig e-legitimation. Invänta svaret innan du återgår till arbete, skola eller fritidsaktivitet.
- Om du behöver informera personer som är under 18 år behöver du avgöra om det i stället är vårdnadshavaren som ska kontaktas.
- Se även länkar till informationsmaterial längre ned i dokumentet.
- Eventuellt munskyddsanvändning enligt nedan.

Smittspårning

Smittspårning görs enligt Folkhälsomyndighetens nationella vägledning och innebär att ta reda på hur en person har blivit smittad och att identifiera de som kan vara smittade eller som har blivit utsatta för smitta. När det gäller smittspårning har alltid hälso- och sjukvården den grundläggande skyldigheten att se till att en smittspårning genomförs men den enskilde ska medverka i smittspårningen så långt som möjligt. Vid misstanke om utbrott/klustersmitta behöver en utbrotsutredning göras och den görs i samråd med smittspårningsenheten och/eller smittskyddet. Smittskyddsläkaren kan med stöd av 3 kap 5 § smittskyddslagen också uppdraga till annan att göra smittspårningen. Smittspårningen är således obligatorisk för den smittade att medverka i. Den enskilde ansvarar dock inte själv för att vidta smittspårningsåtgärder men kan beroende på sjukdom vara den som kontaktar dem som kan ha utsatts för smitta.

Smittspårning av nära kontakter

- Smittspårningen omfattar normalt nära kontakter som den smittade personen hade **48 timmar innan hen fick symtom**. Om personen inte har symtom räknas smittsamhet från provtagningsdatum för positivt test. Med **nära kontakt** avses någon man umgåtts med inom två meters avstånd och under sammanlagt 15 minuter eller mer under ett dygn.
- **Identifiera nära kontakter** enligt ovan **och ge informationen på [Till dig som kan ha blivit utsatt för smitta av covid-19 - 1177 Vårdguiden](#)** både till dem med och utan symtom.
- **Uppmana alla nära kontakter med symtom att stanna hemma och testa sig** (se 1177.se).
- **Uppmana alla nära kontakter utan symtom att testa sig**. Detta gäller från och med högstadieålder. Testning rekommenderas ske **direkt** när den nära kontakten får information om möjlig exponering (exponeringsdagen kallas dag 1) och därefter på **dag 5** efter senaste nära kontakten med indexfallet. Om mer än 7 dagar gått sedan senaste nära kontakten rekommenderas ingen testning. På samma sätt rekommenderas till exempel endast ett testtillfälle om närkontakten får information om exponering på dag 4 eller senare. Personer som haft covid-19 under det senaste halvåret eller som är vaccinerade med sin första dos för minst tre veckor sedan är undantagna testningsrekommendationen om de inte har symtom.
- **Alla nära kontakter som kan ska arbeta hemifrån** under 14 dagar och bör under denna period undvika att träffa andra utanför hushållet. **Närkontakter utan symtom som inte kan arbeta hemifrån kan gå till arbete även i väntan på provsvar**. Det är då särskilt viktigt att distans kan hållas till övriga medarbetare på arbetsplatsen. Tänk på att hålla avstånd även i omklädningsrum och vid rast. Samåkning ska undvikas. Vid konstaterad smitta på arbetsplats gäller särskilda rekommendationer för munskyddsanvändning, se nedan.
- Barn och elever som känner sig helt friska kan gå till förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning enligt den verksamhetens riktlinje men bör avstå från fritidsaktiviteter och kontakt med andra utanför hushållet efter skoltid.
- För barn och elever i förskola och grundskola gäller särskilda rekommendationer för testning, se Information till huvudmän och rektorer vid fall av covid-19 inom skola eller förskola på sidan [Smittspårning covid-19 - Region Kalmar län](#).
- Särskilda regler gäller inom vård och omsorg och för hushållskontakter till bekräftade fall, se nedan.

Smittspårning av hushållskontakter och hemisolering

- En person med eller utan symtom som är hushållskontakt till ett konstaterat covid-19 fall ska anses vara ett misstänkt fall av covid-19 och får därför **förhållningsregler**.
- Som hushållskontakt räknas **en person som delat boende med någon som är konstaterad covid-19 positiv när denna person varit smittsam**. Smittsamhet räknas från 48 timmar före symtomdebut till i normalfallet > 2 dygns feberfrihet och allmän

förbättring samt minst 7 dagar sedan symtomdebut. Om personen inte har symtom räknas smittsamhet från provtagningsdatum för positivt test.

- Förhållningsreglerna gäller från det datum den person som är smittad blev provtagen och upphör 7 dagar senare, förutsatt att den som är utsatt för smitta inte får symtom. **Får den som är utsatt för smitta symtom ska testning ske. Testning rekommenderas dessutom dag 5 om den som är utsatt för smitta inte fått symtom.**
- Det innebär att alla som arbetar eller studerar och som bor med eller har bott med en person som har covid-19 under den smittsamma perioden alltid **ska arbeta eller studera hemifrån under minst 7 dagar**. Detta gäller oavsett om man har symtom och även om man tar ett test som visar att man inte har covid-19. Barn och unga ska stanna hemma från förskolan, skolan eller gymnasiet och samtliga fritidsaktiviteter, även om de inte har några symtom. Den som har tagit ett test som frisk hushållskontakt måste stanna hemma till provsvaret kommit, även om detta blir längre tid än sju dagar. Den som inte har möjlighet att arbeta hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.
- Personer som haft covid-19 under det senaste halvåret eller som är vaccinerade med sin första dos för minst tre veckor sedan är undantagna förhållningsregler för hushållskontakter och testningsrekommendationen om någon i hushållet är sjuk men ska alltid stanna hemma och testa sig om de får symtom. Det innebär att den som först insjuknar i en familj ofta kan återgå till arbete eller skola innan övriga familjen har tillfrisknat. För vård- och omsorgspersonal gäller särskilda riktlinjer.

Munskydd på arbetsplatser vid konstaterad smitta

Enligt [smittskyddsläkarens regionala rekommendationer i Kalmar län](#) rekommenderas munskydd på arbetsplatser vid konstaterad smitta, se [Det nya coronaviruset | Region Kalmar Län](#). Förbered verksamheten genom att ha en plan för hur munskydd ska införskaffas i händelse av smitta. Använd alltid CE-märkt engångsmunskydd och informera om hur det ska användas på ett smittsäkert sätt, se Folkhälsomyndighetens information. Användning av munskydd rekommenderas för arbetstagare när:

- arbetstagare med konstaterad infektion har vistats i verksamheten i smittsamt skede och
- tillräckligt avstånd mellan arbetstagare inte kan säkerställas

Användning av munskydd rekommenderas till och med sju dagar efter det att det senaste konstaterade fallet har vistats på arbetsplatsen i smittsamt skede.

Användande av antigen tester ("snabbtester")

Antigen tester möjliggör en snabb testning för att hitta smittsamma personer i ett tidigt skede av infektionen. Antigen testerna ersätter inte den etablerade PCR-testningen. Antigen tester kan användas som ett komplement till PCR-testning för att påvisa pågående covid-19 när det finns behov av ökad testkapacitet, i situationer där det finns behov av ett snabbt testresultat, vid smittspårning och vid screening på arbetsplatser när smittspridningen i samhället är omfattande.

Så kallade **självtester** (provtagning och tolkning av testresultat görs av personen själv) används inte för att utesluta misstänkt sjukdom, vid smittspårning och inte heller för att möjliggöra aktiviteter utanför de begränsningar som aktuella smittskyddsåtgärder kräver på grund av smittläget.

Antigen testning vid smittspårning

Antigen test kan användas som komplement till PCR-test vid testning i samband med smittspårning eftersom smittspårningen vid covid-19 behöver ske utan dröjsmål för att göra det möjligt att ge förhållningsregler och effektivt bryta smittkedjor. I samband med pågående eller upprepade smittutbrott, exempelvis på en arbetsplats, skola eller inom delar av en kommun, kan en bred testning göras. Sådan testning är en del av smittspårningen vid en utbrotsutredning, utförs av smittspårare under ansvar av smittspårningsansvarig läkare och samordnas av smittspårningsenheten. Testning för påvisning av samhällsfarlig och smittspårningspliktig sjukdom ska alltid utföras på ordination av läkare. På så sätt säkerställs att resultatet kan bedömas i relation till misstankegraden och möjliggöra snar tillämpning av smittskyddsåtgärder i enlighet med smittskyddslagen. Ett positivt provsvar ligger till grund för förhållningsregler enligt smittskyddslagen.

Screening som initieras av arbetsgivare

Inom ramen för arbetsmiljöansvaret ska arbetsgivaren regelbundet genomföra riskbedömningar som ligger till grund för de skyddsåtgärder som behöver vidtas för att minska risken för smittspridning av covid-19 på arbetsplatsen. Screening med antigen tester på arbetsplatser där nära kontakter mellan människor inte kan undvikas kan vara en av de åtgärder som sätts in som en tilläggsåtgärd för att minska risken för smittspridning på arbetsplatsen. Sådan screening är inte en del av den smittspårning som sker inom hälso- och sjukvården (se avsnittet ovan), utan sker på arbetsgivarens initiativ och är frivilligt för arbetstagaren. Screeningen är alltid en tilläggsåtgärd till övriga skyddsåtgärder som arbetsgivaren bedömt nödvändiga. För att öka sannolikheten att hitta en smittsam person behöver screeningen genomföras regelbundet flera gånger per vecka. Om screeningen däremot görs oregelbundet och sällan är screeningens värde tveksamt.

Några exempel på miljöer där regelbunden screening kan vara lämpligt är viss verksamhet inom polis och räddningstjänst, vissa byggarbetsplatser, personal inom skola och annan utbildningsverksamhet, restaurangkök samt teater- och filmproduktioner. Exempelen som ges är inte en komplett lista utan ska endast ses som exempelområden.

Det är viktigt att hela processen, från förvaring av testet till avläsning av resultat har kvalitetssäkrats, följer tillverkarens rekommendationer och att den som utför testningen har tillräcklig information för uppgiften. Vid manuell avläsning av antigen tester är lokalens

ljusförhållanden av stor vikt. Riskbedömning avgör vilka skyddsåtgärder i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter Smittrisker AFS 2018:4 som ska tillämpas på en arbetsplats för att skydda personal som utför provtagning och analys samt hanterar smittförande avfall.

Personer som det senaste halvåret genomgått covid-19 behöver generellt inte inkluderas i screening. Personer som har vaccinerats med minst en dos och där det gått tre veckor sedan vaccinationstillfället behöver generellt inte heller inkluderas i screeningen.

Den arbetsgivare som planerar införa organiserad screening behöver beakta följande:

- Screening är **frivillig** och regleras mellan arbetsgivare och arbetstagare.
- **Arbetsgivaren bör påminna arbetstagaren om att screening inte ersätter den testning som görs då den individuella arbetstagaren misstänker sjukdom, vid symtom eller vid smittspårning.**
- Arbetsgivaren behöver utarbeta en **handlingsplan** för hur screeningen ska genomföras. Då screening sker i hälso- och sjukvårdens regi (företagshälsovård eller upphandlad tjänst) behöver planen inkludera **tillgång till kompetens att utföra provtagning, analys och avläsning av antigen-testet. Enligt hälso- och sjukvårdslagen krävs dessutom ansvarig läkare för ordination och för hantering av resultat** (förhållningsregler om hur man ska bete sig när man är smittsam, anmälan till smittskyddsläkaren och smittspårning). Handlingsplanen bör även innehålla information till arbetstagaren om hur den ska agera utifrån ett positivt eller ett negativt testresultat. Undantag från kraven ovan gäller för självtester. Sådan användning lyder inte under hälso- och sjukvårdslagen.
- Arbetsgivare som planerar att använda screening behöver ha **rutiner för hur de ska dokumentera** att ett test har beställts, utförts samt var och hur testresultaten ska dokumenteras. En sådan dokumentation är viktig för att kunna utvärdera om screeningens syfte ha uppnåtts.

Ytterligare beaktanden i de fall självtester används:

- Folkhälsomyndigheten rekommenderar att arbetsgivaren i sin handlingsplan har etablerat rutiner som möjliggör att arbetstagaren utan dröjsmål får kontakt med läkare för att vid ett positivt testresultat låta läkaren göra de undersökningar och ta de prover som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger.
- Arbetsgivaren behöver informera arbetstagaren om att det är arbetstagaren själv som ansvarar för att utan dröjsmål ta kontakt med läkare vid ett positivt testresultat för att låta läkaren göra de undersökningar och ta de prover som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger. Om detta inte finns tillgängligt genom arbetsgivaren innebär det i regel att arbetstagaren behöver söka upp den av regionen etablerade storskaliga testningen för covid-19.

Sammanfattningsvis bör de aktörer som erbjuder antigen-test i sin verksamhet säkerställa att de följer smittskyddslagen och hanterar positiva provsvar på ett korrekt sätt. **Antigen-test ska inte användas vid symtom och alla positiva antigen-test ska kontrolleras med PCR.** De verksamheter som planerar att införa antigen-test ska göra detta i samarbete med läkare och

verksamheten måste säkerställa att de inköpta testerna uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på sensitivitet och specificitet och att testet är CE-märkt. Testet ska också genomföras på ett patientsäkert och kvalitetssäkert sätt i enlighet med legala krav som ställs på utförare av diagnostik för covid-19. Läs mer på [Antigentester för påvisning av covid-19 - Utökad testning för covid-19 \(folkalsomyndigheten.se\)](#) Se även Region Kalmar läns [Vägledning för användning av antigen test utanför vården.pdf \(regionkalmar.se\)](#)

Screening av elever i skolmiljö och annan utbildningsverksamhet

Regelbunden screening kan vara ett framtida komplement till andra lokala förebyggande åtgärder som vidtas för att skydda elever och skolpersonal. I nuläget bedömer Folkhälsomyndigheten efter dialog med Skolverket att riskerna och osäkerheterna kring nyttan av regelbunden screening bland i synnerhet yngre elever överväger eventuella fördelar. Det saknas ännu kunskap om screening av skolelever kan sägas utgöra ett viktigt verktyg för att förhindra smittspridning och minska sjukfrånvaro i skolan. För ytterligare information om screening av elever hänvisas till Folkhälsomyndighetens vägledning för användning av antigen test.

Hantering av testresultat vid screening med antigen test som initieras av arbetsgivare

Se **figur 1**.

Negativa provsvar


- Antigen test har generellt sett sämre känslighet än PCR-tester. Negativa testresultat från screening av personer som inte upplever sig ha symtom utesluter därför inte covid-19. Falskt negativa testresultat kan även erhållas om provet inte tagits på rätt sätt.
- Eftersom den som screenats inte upplever sig ha symtom kan personen fortsätta i verksamheten som planerat. Skyddsåtgärder som är på plats behöver fortsatt följas.

Positiva provsvar

- Personen som får ett positivt provsvar vid screening med antigen test där avläsning av testresultatet görs av hälso- och sjukvårdspersonal är **ett misstänkt fall och ges förhållningsregler på samma sätt som vid ett bekräftat fall**.
- Provsvaret **ska skyndsamt bekräftas med ett kompletterande PCR-test**.
- Patientens hushållskontakter rekommenderas att om möjligt arbeta hemifrån. Förhållningsregler till hushållskontakter ges först om det misstänkta fallets PCR-test blir positivt.
- Anmälan till smittskyddsläkaren kan vid skyndsamt hantering invänta PCR och göras om det kompletterande PCR-testet är positivt. Smittspårning av nära kontakter i verksamheten påbörjas vid positivt PCR-test eller om flera positiva antigen test påvisas samtidigt i en verksamhet.

Positiva provsvar vid självtest (provtagning och tolkning av testresultat görs av personen själv)

- Vid positivt resultat från ett självtest behöver personen **självisolera sig** och omgående testas med PCR test. Testning sker via 1177.se, hälsocentral eller enligt etablerade rutiner på arbetsplatsen. Personen ska enligt smittskyddslagen göra detta skyndsamt.



Figur 1. Flödesschema screening med antigen test på en arbetsplats av personer utan symtom.

Kontaktuppgifter

Vid misstanke om utbrott i verksamheten kontaktar verksamhetsansvarig (till exempel rektor, avdelningschef eller liknande) smittspårningsenheten eller smittskyddet enligt nedan.

Enhet	Telefon	Telefontid	Kontaktväg för
Smittspårningsenheten, smittspårningssamordnare	0480-44 80 03	Vardagar 07.30-16.00	Vård och omsorg, hushållskontakter, företag
Smittskydd Kalmar, smittskyddssjuksköterska	0480-845 30 0480-845 37	Vardagar 08.00-16.00	Skolor, förskolor, större utbrott. Vid svårighet att komma fram på telefon skickas ett mail till funktionsbrevlådan nedan.
Funktionsbrevlåda corona@regionkalmar.se		Bevakas kontorstid	Privatpersoner, allmänna frågor. Skicka aldrig personuppgifter via epost.

Läkare på smittspårningsenheten har beredskap på helgerna kl. 8-18 och hanterar då akuta utbrottsärenden. Sökning via regionens växel.

Tack för att du bidrar till smittspårning av covid-19!

Genom att personer som kan ha varit utsatta för smittrisk snabbt informeras om detta och får råd om testning och att träffa så få personer som möjligt kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras.

Tack för din hjälp!

Lisa Labbé Sandelin

Smittskyddsläkare i Kalmar län